

Biossegurança e Vigilância

Medidas que os caçadores devem manter:

- Eviscerar os animais nos locais apropriados que devem de seguida ser limpos e desinfetados;
- Não abandonar as vísceras no local e garantir o seu correto encaminhamento:
 - Enterramento em local apropriado, a profundidade suficiente para impedir a remoção por animais e coberto por cal viva ou outro desinfetante, seguido de uma camada de pelo menos 1 metro de terra;
 - Encaminhamento para unidade de transformação de subprodutos de categoria 1 ou 2 aprovada;
 - Encaminhamento para campos de alimentação de aves necrófagas licenciados.
- Identificar as carcaças dos animais abatidos com o selo oficial do ICNF;
- Promover o exame inicial ou a inspeção sanitária dos animais abatidos.

Como podem os caçadores ajudar a prevenir a introdução de PSA em Portugal?

O caçador que se desloque para áreas infetadas pelo vírus da PSA deve ter presente as seguintes medidas preventivas:

- **Limpeza e desinfecção** do vestuário, calçado e equipamento de caça;
- Não transportar **carne, produtos à base de carne e de salsicharia ou troféus** da zona infetada* para a zona livre de PSA;
- **Não contactar com suínos domésticos** após manipular javalis, sem adotar procedimentos de limpeza e desinfecção;

Atenção

Consulte a informação sobre a situação sanitária dos países afetados em www.dgav.pt

Contactos

DSAVR Norte	253 783 016 dsavrn@dgav.pt
DSAVR Centro	961 224 271 dsavrc@dgav.pt
DSAVR Lisboa e Vale do Tejo	263 146 800 secretariado.lvt@dgav.pt
DSAVR Alentejo	266 730 580 secretariado_dsvralentejo@dgav.pt
DSAVR Algarve	289 098 265 dsavr.algarve@dgav.pt
ICNF	213 507 900/4 dgrca@icnf.pt

Notifique na APP ANIMAS

Encontrou um ou mais javalis mortos?



ANIMAS

Instale no telemóvel <https://animas.icnf.pt>

Ficha Técnica

Edição DGAV: abr. 2022 | Revisão abr. 2022

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
Campo Grande, nº 50 | 1700-093 Lisboa
213 239 500 | dirgeral@dgav.pt | www.dgav.pt



REPÚBLICA
PORTUGUESA


AGRICULTURA
E ALIMENTAÇÃO



abril 2022

Peste Suína Africana (PSA)

O papel do caçador na sua prevenção e vigilância



dgav
Direção Geral de Alimentação e Veterinária


Direção de Serviços de Proteção Animal

Divisão de Epidemiologia e Saúde Animal

O que é PSA?

A PSA é uma doença altamente contagiosa causada por um vírus.

Afeta exclusivamente os suínos, tanto os domésticos como os selvagens (javalis) de todas as idades.



Atenção

A PSA não é transmissível aos humanos

Não existe vacina nem tratamento contra a PSA

Consequências da PSA nos países afetados?

Setor Suinícola

Graves perdas económicas devido a mortalidade elevada dos suínos, ao abate compulsivo de animais infetados ou suspeitos e às restrições ao comércio nacional e internacional.

Setor da Caça

Restrições à caça e ao comércio da carne de caça, restrições à alimentação dos javalis e elevada mortalidade dos javalis, motivando perdas económicas relevantes.



Como é se infetam os javalis?


Os javalis podem infetar-se contactando com outros javalis ou suínos doentes ou mortos e com alimentos ou materiais contaminados com o vírus da PSA.

Transmissão Direta

- Javalis ou suínos infetados;
- Carcaças de javalis ou suínos infetados;
- Secreções e excreções (corrimento nasal, ocular ou genital, fezes, urina e sêmen);
- Sangue de animais infetados.

Transmissão Indireta

- Consumo de restos de carne ou produtos derivados (salsicharia) produzidos a partir de animais infetados;
- Contato com vestuário, calçado, materiais e equipamento contaminados;
- Através de certo tipo de carraças moles (Argasídeos) infetadas.



Quais são os sinais da PSA?

Os sinais no javali surgem entre **3 a 15 dias** após a infeção (período de incubação).

Podem ser os seguintes:

- Febres altas e apatia.
- Vômitos, diarreia e abortos em todas as idades.
- Vermelhidão cutânea (orelhas, patas, barriga).
- **Morte em 6 a 13 dias.**



Javali morto após infeção

Baço aumentado e hemorrágico

Atenção

É muito importante manter uma adequada densidade de javalis nas zonas de caça
Perante a observação de anormal ocorrência de javalis mortos contactar de imediato os serviços da DGAV ou do ICNF

